

木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD）琼脂使用说明书

【货号】 CM219

【用途】

用于沙门氏菌和志贺氏菌的选择性分离培养。（GB 标准、FDA BAM、ISO 标准）

【规格】 250g/瓶

【成分】（g/L）

酵母膏	3.0
L-赖氨酸	5.0
木糖	3.75
乳糖	7.5
蔗糖	7.5
氯化钠	5.0
酚红	0.08
硫代硫酸钠	6.8
柠檬酸铁铵	0.8
去氧胆酸钠	2.5
琼脂	15.0

【pH 值】

7.4±0.2 (25℃)

【原理】

酵母粉为细菌生长提供维生素和辅助因子，木糖、乳糖和蔗糖作为可发酵碳源。除志贺氏菌外，其他大多数肠杆菌均发酵木糖，加入赖氨酸是为了鉴别沙门氏菌。沙门氏菌发酵木糖产酸，形成的酸性环境有利于该菌产生脱羧酶，沙门氏菌使赖氨酸脱羧，从而使培养基的 pH 升高向碱性转变，但这种转变可因其他菌发酵乳糖和蔗糖产生大量的酸而被阻止。

在碱性的条件下，硫代硫酸钠及柠檬酸铁铵与沙门氏菌产生的硫化氢反应，使得菌落的颜色呈黑色；但当酸性条件下时，这种反应被抑制。酚红作为酸碱指示剂，氯化钠维持培养基的渗透压，去氧胆酸盐抑制革兰氏阳性菌的生长。

【用法】

称取 58.9g 于 1L 蒸馏水中，加热煮沸灭菌，冷却至 50℃左右，摇匀，倾注平板备用。

注：根据培养基的实际用量，称取相应比例的干粉进行配制。

【注意事项】

- 1、勿需高压灭菌。
- 2、勿过度加热。

【质量控制】



质控菌株	接种量 (CFU)	参比或计 数培养基	方法	培养条件	质控结果
肠沙门氏菌肠亚种 鼠伤寒血清型 ATCC 14028	50-250	TSA	定量	36°C±1°C 18h~24h	PR≥0.5, 黑色菌落
肠沙门氏菌肠亚种 鼠伤寒血清型 CICC 25045 [CMCC(B) 50976]					
福氏志贺氏菌 CMCC (B) 51572					PR≥0.5, 无色菌落, 无黑心
大肠埃希氏菌 ATCC 25922	--		半定量		G<5, 黄色菌落
大肠埃希氏菌 CICC 25012 [CMCC(B) 43201]					
金黄色葡萄球菌 ATCC 6538					G≤1
金黄色葡萄球菌 CICC 25018 [CMCC(B) 26305]					

【保存】

干粉培养基密封保存于阴凉干燥处。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面, 输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的, 不用于临床诊断或治疗。